

根群・生育・有効分げつ

撒布後5日以上止水してください

KR-311

田植そのあとに<sup>®</sup>

田植え後 20 ~ 60 日頃に 1 袋 (3kg) を撒布

注意書きをよくお読みのうえご使用ください

粒材 NET 3kg

ワキ(湧き)軽減



香蘭産業株式会社



稲ワラや雑草、ヒコバエなどをそのままにしていると、田植え後の水温の上昇とともにワク(湧く)現象が現れます。ワラなどが未分解のため還元状態になり、イネの根を傷め生育に影響します。

田植え後20～60日頃またはワキの発生が心配になったとき「田植そのあとに」を撒布することによりワキを軽減し、イネの健全生育を助けます。撒布後は5日以上止水してください。

四隅に多めの撒布で水の滞留場所にアタック！ 発生場所にピンポイント撒布も効果あり！

## 田植そのあとに<sup>®</sup>

田植え後の水温上昇によるワキ(湧き)を軽減！  
ワキ(湧き)の発生が心配な時に止水して撒布してください。

### 期待される効果

- 発酵ガスの吸着安定。
- 濁り沈降・発藻減少。
- 根群発達・健全生育・収穫時の根の持ち上げ減少。
- ワラの効率を高めおいしいお米づくりが期待されます。

### 田植そのあとに 使い方と注意

- 田植後20～60日頃(幼穂形成期)までに10aあたり本品を1袋(3kg)を撒布してください。(ワキ(湧き)が気になりだしたときなど目安)
- 風上より撒布してください。
- 撒布後5日以上 止水してください。
- 固まりがある場合はほぐして撒布してください。
- 開封したものは使い切ってください。
- 石灰系の資材と同時使用はできません。
- 水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて  
幼児・子供の手の届かないところに保管してください。
- ◎ 本品は肥料や農薬ではありません。

な～るほど！

### もう一つのワキ(湧き)予防法

稲刈り後、稲ワラ腐熟促進材「ワラクサール」20kg/10a を撒布・浅くすき込んで、

冬の間にはワラを分解させましょう。翌春の耕起もはかどります。

香蘭産業株式会社

神奈川県平塚市下島546

TEL:0463-55-0528 FAX:0463-55-7764